

**+ PLUS**  
POUR VOUS

# RECICORT®

SOLUTION AURICULAIRE EN GOUTTES  
POUR CHIENS ET CHATS

DERMATOLOGIE

## CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT



Solution auriculaire  
et cutanée  
anti-inflammatoire  
*sans antibiotique*



Acétonide de triamcinolone  
Acide salicylique



Flacon de 20 mL



Une à deux instillations  
par jour

### + UTILISATION

Chez les chiens et les chats :

- Otite externe
- Traitement symptomatique de la dermatite séborrhéique du pavillon de l'oreille

### + POSOLOGIE

#### • Conduit auditif :


- > Après avoir nettoyé la surface externe du conduit auditif et de l'oreille, instiller **8 à 10 gouttes** dans le conduit auditif, **une à deux fois par jour**, jusqu'à disparition des symptômes depuis quelques jours, puis masser l'oreille et le conduit auditif pour assurer la bonne répartition du produit
- > Ne pas dépasser 7 gouttes par kg et par jour
- > Ne pas dépasser un total de 14 jours de traitement consécutif
- > En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours de traitement, une réévaluation est nécessaire

- **Pavillon auriculaire** : appliquer localement deux fois par jour jusqu'à disparition des lésions, sans dépasser un total de 14 jours



Acétate de triamcinolone, acide salicylique

## ✚ L'INFLAMMATION EST AU COEUR DE LA MISE EN PLACE DES OTITES



## ✚ LA COMPOSITION DE RECICORT® PERMET D'AGIR SUR L'OREILLE INFLAMMÉE AVANT QUE LA SURINFECTION N'APPARAISSE

### De l'acétate de triamcinolone

- Glucocorticoïde à action modérée<sup>1</sup> possédant une action anti-inflammatoire et vasoconstrictrice
- Diminue la réponse inflammatoire et les symptômes associés au prurit
- Les corticoïdes topiques seuls sont appropriés pour gérer les otites modérées non surinfectées<sup>2</sup>

### De l'acide salicylique associé

- Propriétés kératolytiques, antiseptiques et antifongiques<sup>3</sup>
- Solubilisation des protéines de surface, permettant une desquamation des débris kératolytiques<sup>3</sup>

#### Références

1. Guaguère E., Besignor E., Carlotti D. N., Héripret D., Pin D., Prélaud P., Bieber T. (2011), Clinical practice guidelines on the best use of topical glucocorticoids in canine dermatology. *Pratique médicale et chirurgicale de l'animal de compagnie*. 46, S1-S21
2. Nuttall T. (2018), Managing chronic and recurrent otitis externa in dogs. *Veterinary practice today*. 6, 23-29
3. Cole L., Kwochka K., Kowalski J., Hillier A., Hoshaw-Woodard S. (2019) Evaluation of an ear cleanser for the treatment of infection otitis externa in dogs. *Veterinary therapeutics*.

#### RECICORT® Solution auriculaire en gouttes pour chiens et chats

**Composition** : Un mL contient : Substances actives : Acétonide de triamcinolone 1,77 mg, Acide salicylique 17,7 mg. **Indications** : Chez les chiens et les chats : otite externe; traitement symptomatique de la dermatite séborrhéique du pavillon de l'oreille. **Contre-indications** : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux corticoïdes, à l'acide salicylique ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser chez les animaux dont la membrane tympanique est perforée, le produit pouvant être ototoxique. Ne pas utiliser chez les chiens atteints de démodicose. **Effets indésirables** : L'utilisation prolongée et massive de corticoïdes en préparations topiques est connue pour déclencher des effets locaux et systémiques, notamment une suppression de la fonction surrénalienne, un amincissement de l'épiderme et un retard de cicatrisation. Dans de rares cas, une rougeur de la peau et une desquamation ont été rapportées. **Précautions d'emploi** : La dose recommandée pour le traitement (8 à 10 gouttes par oreille, une ou deux fois par jour) ne doit pas dépasser 7 gouttes par kg de poids corporel par jour. Il convient de veiller à ne pas dépasser cette quantité, en particulier lorsque l'animal traité est de petite taille ou lorsque les deux oreilles doivent être traitées. **Présentation** : Flacon de 20 mL. **AMM** FR/V/4972282 8/2016.

Liste I. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.