

EASOTIC®: UN MODE D'ADMINISTRATION UNIQUE



easOtic

- **Pompe doseuse calibrée :**
contrôle de la dose délivrée.
- **Flacon « Airless » :**
utilisable dans toutes les positions, pas de réabsorption.
- **Application facilitée**
d'une juste dose non contaminée.
- **Capot transparent (encliquetage et protection) :**
étanchéité garantie.
- **Grip renforcé, ergonomie :**
prise en main facilitée.
- **Canule souple :**
administration atraumatique.

MODE D'EMPLOI

1



Agiter avant la première utilisation (jusqu'à entendre la bille à l'intérieur).

2



Amorcer la pompe par une ou deux pressions

APPLIQUER 1 DOSE / JOUR / OREILLE, PENDANT 5 JOURS
quel que soit la taille et le poids du chien.

VISITE DE CONTRÔLE CONSEILLÉE À J+14 après le début du traitement.

AMÉLIORATION DE L'OBSERVANCE PAR LE PROPRIÉTAIRE,
POUR UN PLUS GRAND SUCCÈS THÉRAPEUTIQUE.

BIBLIOGRAPHIE

- (1) Brazzini B, Pimpinelli N, New and established topical corticosteroids in dermatology, clinical pharmacology and therapeutic use. Am J. Clin Dermatol 2002 ; 3: 47-58.
- (2) Lyskova P et al, Identification and antimicrobial susceptibility of bacteria and yeasts isolated from healthy dogs and dogs with otitis externa, J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med. 2007;54(10):559-63).
- (3) Rigaut D, Maynard L, Fungicidal activity in vitro of topical ear treatments against canine otic strains of Malassezia pachydermatis, ESVD-ECVD Congress 2009.
- (4) Rey-Grobellet X., Rigaut D., Rème C. Persistence of antimicrobials in the ear canal dogs treated once daily for 5 days with 1 ml of a topical formulation. ESVD-ECVD Congress Florence, 23-25 Septembre 2010.
- (5) Hariharan H et al, Update on antimicrobial susceptibilities of bacterial isolates from canine and feline otitis externa, Can Vet J. 2006; 47(3): 253-255).
- (6) Pellerin J., Leveleux S., Epidémiologie des bactéries pathogènes, Le point vétérinaire, 2008, 287, 23-26.

MENTIONS LÉGALES

EASOTIC SUSPENSION POUR INSTILLATION AURICULAIRE POUR CHIEN. Composition : Acéponate d'hydrocortisone 1,11mg/ml Nitrate de miconazole 15,1mg/ml. Sulfate de gentamicine 1505UI/ml. **Indications :** Traitement des otites externes aiguës et des manifestations aiguës des otites externes récurrentes dues à des bactéries sensibles à la gentamicine, et à des champignons sensibles au miconazole, en particulier Malassezia pachydermatis. **Contre-indications :** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients, aux corticoïdes, ou à d'autres agents antifongiques azolés ou à d'autres aminoglycosides. Ne pas utiliser en cas de perforation de la membrane tympanique. Ne pas utiliser en association avec des substances connues pour leurs effets ototoxiques. Ne pas utiliser chez les chiens présentant une démodécie généralisée. **Précautions particulières d'emploi et de conservation :** Lire la notice. **Effets indésirables :** Une rougeur de l'oreille légère à modérée a été constatée chez 2,4% des chiens traités. Des papules ont pu être observées plus rarement (chez moins de 1% des chiens traités). Dans aucun des cas le traitement avec le médicament vétérinaire n'a été interrompu et l'ensemble des chiens ont retrouvé leur état normal sans thérapie spécifique. Dans de très rares cas (<0,01 %), l'utilisation du médicament vétérinaire peut entraîner une déficience de l'audition, généralement transitoire et surtout chez les chiens âgés. Si cela se produit, le traitement doit être interrompu. Dans de très rares cas (< 0,01 %), des réactions d'hypersensibilité de type I (œdème facial, prurit allergique) ont été observées. Si cela se produit, le traitement doit être interrompu. **Posologie et voie d'administration :** 1 ml contient 1,11 mg d'acéponate d'hydrocortisone, 15,1mg de miconazole (nitrate de) et 1505 IU de gentamicine (sulfate de). Il est recommandé de nettoyer et sécher le conduit auriculaire avant traitement et de couper les poils en excès. La posologie recommandée est de 1 ml par oreille infectée une fois par jour pendant cinq jours consécutifs. Bien agiter le flacon avant la première administration et amorcer fermement la pompe. Introduire la canule atraumatique dans le conduit auditif. Instiller une dose (1 ml) de produit dans chaque oreille infectée. On obtient cette dose en pressant une fois la pompe. Grâce au système de pompe hermétique, on peut administrer le produit quel que soit la position du flacon. Cette présentation permet de traiter un chien souffrant d'otite bilatérale. **Conservation :** 2 ans. Après première ouverture du conditionnement primaire : 10 jours. **Présentation :** AMM EU/2/08/085/001, flacon-pompe de 10ml GTIN 03597133047790. **Catégorie :** Liste I - Usage vétérinaire - A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire. VIRBAC France – 13^{ème} Rue LID – BP 447 – 06515 CARROS CEDEX. Virbac Assistance : 0 811 90 46 06 (*Numéro AZUR. Coût d'un appel local depuis un poste fixe).

N°226 069 – Mars 2015 – www.groupecomplis.com – 12132763CH

easOtic

1 dose par jour
et par oreille.
pendant 5 jours

Facilité d'administration

Anti-inflammatoire
puissant et sûr

diminution rapide
de l'inflammation
et de la douleur

Large spectre
anti-microbien

Résistances limitées

EN CAS D'OTITE,
TENDEZ L'OREILLE



**De mémoire d'oreille, on n'a jamais vu
autant d'arguments réunis dans un seul produit.**

Ce médicament vétérinaire contient un antibiotique. Toute prescription d'antibiotique a un impact sur les résistances bactériennes. Elle doit être justifiée.

Virbac

Façonnons l'avenir de la santé animale

Virbac

EASOTIC®: UNE FORMULE UNIQUE



L' ACÉPONATE D'HYDROCORTISONE

- **Glucocorticoïde** de la classe des diesters.
- **Puissance anti-inflammatoire** locale élevée : classe 3/4.
- **Efficacité locale** et effets secondaires limités (faible biodisponibilité de la molécule).
- **Ratio bénéfice / risque** optimisé.
- **Biotransformation locale** avec activation épidermique et inactivation dans le derme profond.

BÉNÉFICE ↗
> Puissance AI
> Pénétration cutanée

RISQUE ↘
> Impact systémique
> Atrophie cutanée

4

> Très forte [600x hydrocortisone]
Clobétasol-17-propionate
Bétaméthasone dipropionate

3

> Forte [50-100x hydrocortisone]
Bétaméthasone valérate
Méthylprednisolone acéponate (AMP)
HYDROCORTISONE ACÉPONATE (HCA)
Dexaméthasone

2

> Modérée [2-25x hydrocortisone]
Triamcinolone acétonide

1

> Faible
Hydrocortisone

Index thérapeutique des dermocorticoïdes
en médecine humaine⁽¹⁾

INTÉRÊT D'UN ANTI-INFLAMMATOIRE PUISSANT DANS LA GESTION DES OTITES EXTERNES :



- Action **décongestionnante rapide**.
- Diminue la **douleur**, le **prurit** et l'**œdème**.
- Diminue les **sécrétions glandulaires**.
- Relance la migration épithéliale.



EASOTIC®: EFFICACITÉ ANTIFONGIQUE

LE MICONAZOLE : UN ANTIFONGIQUE RAPIDE

- **Malassezia pachydermatis** : 2^{ème} micro-organisme isolé dans les otites externes du chien après *Staphylococcus pseudintermedius*⁽²⁾.
- **Miconazole** : action fongicide rapide sur *Malassezia pachydermatis* vs Clotrimazole⁽³⁾.

Quantité quotidienne délivrée
en Miconazole la plus élevée* :

EASOTIC® :
Miconazole
15,1 mg

SUROLAN :
Miconazole
~ 5,991-9,985 mg
(Volume d'une
goutte retenu :
= 0,05 ml)

Rémanence
du Miconazole⁽⁴⁾

Concentration en Miconazole
> CMI 90 de *Malassezia
pachydermatis* à **J+10 après la
fin du traitement**.

(étude conduite de 2004 à 2007).

*Parmi les topiques auriculaires du marché vétérinaire.

EASOTIC®: EFFICACITÉ ANTI-BACTÉRIENNE

LA GENTAMICINE : UN LARGE SPECTRE D'ACTION



90%

**DE SENSIBILITÉ À LA
GENTAMICINE TOPIQUE**
SUR DES ISOLATS DE
BACTÉRIES PROVENANT
D'OTITES EXTERNES
CANINES (1819) ⁽⁵⁾.

- « Un choix thérapeutique en première intention, pour son action sur l'espèce la plus fréquente, *Staphylococcus pseudintermedius* »⁽⁶⁾.
- Action sur *Staphylococcus pseudintermedius*, *Streptococcus*.
- Induction de résistances faibles⁽⁴⁾.

Quantité quotidienne délivrée
en Gentamicine la plus élevée :

EASOTIC® :
Gentamicine
1505 UI

OTOMAX :
Gentamicine
535 à 1070 UI

Rémanence
de la Gentamicine⁽³⁾

Concentration en gentamicine
> CMI 90 de *Staphylococcus
pseudintermedius* à **J+10 après
la fin du traitement**.

(étude conduite de 2004 à 2007).